

令和7年度 三重サツキ類栽培こよみ

J A 鈴 鹿
J A 全 農 み え
御質問はJA鈴鹿アグリホットラインまで
☎0120-920880

殺虫剤防除例	月	対象害虫	薬剤名	希釈倍数又は 使用量/10a	備考
	定植前	センチュウ類	ガスタード微粒剤	20~30kg	土壌混和、鎮圧散水(ガス抜き最低2回)
		イシクセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20kg	全面土壌混和(定植直前施用)
		コガネムシ類幼虫	ダイアジノンSLソル	25~50倍	全面土壌混和(散布後直ぐに混和)
	4	ツツジグンバイ	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	モスピラン顆粒水溶剤2,000倍も有効
			トランスフォームフロアブル	2,000倍	
	5	ツツジグンバイ	アドマイヤーフロアブル	2,000倍	株元灌注(発生前、5,000倍、1ℓ/1㎡)
	6	グンバイムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	
	7	ベニモンアオリンガ	オルトラン液剤	250~500倍	ツツジグンバイ(発生初期、生育期株元灌注、250倍、1ℓ/1㎡)
		コガネムシ類幼虫	フォース粒剤	9kg	
	8	ツツジグンバイ	ダントツ水溶剤	2,000倍	殺卵・殺幼若虫作用
		ハダニ類	バロックフロアブル	2,000倍	
	9	グンバイムシ類・ハマキムシ類	スミチオン乳剤	1,000倍	定植時：全面土壌混和及び株元土壌混和 生育期：株元土壌混和
		コガネムシ類	ガゼット粒剤	9kg	

殺菌剤防除例	薬剤名	対象病害	希釈倍数	特 性 他
	トップジンM水和剤	褐斑病、うどんこ病、斑点症	1,000倍	予防治療効果、浸透力
	Zボルドー	もち病	500倍	予防効果
	トリフミン水和剤	うどんこ病	3,000倍	予防治療効果、浸透性
	バシタック水和剤75	もち病	1,000倍	病斑進展阻止効果
	ベンレート水和剤	ごま色斑点病、炭疽病	2,000倍	予防治療効果、浸透移行性
	ベルコート水和剤	炭疽病	1,000倍	予防効果
	ダコニール1000	褐斑病	1,000倍	予防効果、耐光性、耐雨性

1 年生 植出し			2 年目～3 年目						
(施用量:10a当り)			(施用量:10a当り)						
施肥時期		肥 料 名(例)	施肥量	施 肥 例 1		施 肥 例 2			
				肥 料 名(例)	施肥量	肥 料 名(例)	施肥量		
基	3 月	ハイフミン 特号 A	300kg	春	3月上旬	菜 種 粕 〈5.3-2-1〉	100kg	花 木 LP 配 合 〈10-6-6〉	120kg
		又は ハイフミン ハイブリッド G	100-150kg						
		熔 燐	120kg		4月上旬	有機入化成特 A805 〈10-6-7〉	80kg		
クドゲン(粒)	100kg								
肥	4 月	ロング 413 (270日)	100kg	肥	5月上旬	IB ジュニア 〈8-6-4〉	120kg		
		又は 営農経済渉外員に 配合をお問い合わせ下さい			5月中旬	クドゲン(粒)	80kg	IB 化 成 S1 号 〈10-10-10〉	120kg
春肥	5月～6月	菜 種 粕 (ロング使用の場合は施用せず)	120kg						クドゲン(粒)
秋肥	9月下旬	クドゲン(粒)	100kg	秋	9月下旬～ 10月中旬	IB 化 成 S1 号 〈10-10-10〉	80kg	IB ジュニア 〈8-6-4〉	80kg

○平戸・クルメツツジについては、上記施肥基準より、少なく施肥して下さい。